

| Forekomst av luftveisagens PCR 2018-2019 | Uke 50 og 51 | Uke 52 og 1 | Uke 2 og 3 | Uke 4 og 5 | Uke 6 og 7 | Uke 8 og 9 |
|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Bordetella pertussis PCR                 | 1,2 %        | 2,0 %       | 0,8 %      | 0,5 %      | 0,1 %      | 0,2 %      |
| Bordetella parapertussis PCR             | 0,0 %        | 0,6 %       | 0,7 %      | 0,1 %      | 0,9 %      | 0,2 %      |
| Chlamydia pneumoniae PCR                 | 3,2 %        | 5,0 %       | 4,3 %      | 4,8 %      | 3,0 %      | 4,0 %      |
| Mykoplasma pneumoniae PCR                | 0,9 %        | 2,0 %       | 1,4 %      | 0,5 %      | 0,4 %      | 0,6 %      |
| Influenza A PCR                          | 5,1 %        | 13,4 %      | 16,1 %     | 21,5 %     | 24,6 %     | 25,1 %     |
| Influenza B PCR                          | 0,1 %        | 0,0 %       | 0,0 %      | 0,0 %      | 0,0 %      | 0,0 %      |
| Parainfluenza PCR                        | 11,2 %       | 7,2 %       | 6,1 %      | 5,8 %      | 5,0 %      | 3,2 %      |
| RS virus PCR                             | 7,6 %        | 14,5 %      | 12,6 %     | 20,7 %     | 19,2 %     | 16,2 %     |
| Adenovirus PCR                           |              | 2,7 %       | 2,2 %      | 2,2 %      | 2,7 %      | 2,6 %      |
| Humant metapneumovirus PCR               |              | 4,1 %       | 1,6 %      | 1,1 %      | 2,6 %      | 2,3 %      |

For mer informasjon angående influensaovervåking, se Folkehelseinstituttets informasjonssider:

<https://www.fhi.no/sv/influenza/sesonginfluenza/>

